

DEEP SHOOT kezelés kontraindikációk

A DEEP SHOOT AA vagy HA kezelés NEM ajánlott az alábbi esetekben:

- Terhesség vagy szoptatás
- Ha a vendég kevesebb mint 2 héttel ezelőtt esett át botox kezelésen, illetve kollagén vagy bármilyen egyéb töltőanyag kezelésen
- Ismeretlen bőrbetegség
- Cukorbetegség vagy bármilyen autoimmun betegség
- Ha nagyon vékony bőrű a vendég
- Vérrögződési probléma
- Vérnyomáscsökkentő gyógyszer használata
- Korábbi vagy meglévő rákos megbetegedés
- Nagyon érzékeny és száraz bőr
- HIV vagy AIDS fertőzöttség
- Herpes simplex vírusban szenvedők
- Aktív bőrképződés, pikkelysömör vagy ekcéma
- Korábbi vagy meglévő sebgyógyulási probléma
- 1 évnél nem régebbi arcfelvarrás vagy egyéb arcot érintő plasztikai beavatkozás esetén
- Kevesebb mint 2 hónapja történt kémiai hámlasztás
- Gyulladáscsökkentő és nem szteroid gyógyszerek használata (Ibuprofen stb.). Ezeket a gyógyszereket nem javasolt 1 héttel a beavatkozás előtt és 1 héttel utána használni.
- Tetoválás vagy sminktetoválás a kezelt területen
- Fémallergia, különösen krómra és nikkelle
- Akiknek az orvosa vagy bőrgyógyásza bármilyen okból nem tanácsolja a beavatkozást